

Il trattamento con una stecca peroneale serve a correggere la posizione del piede in caso di paralisi dei muscoli elevatori del piede e dei muscoli peroneali, che, se non curata, può portare a una deformazione in equino varo del piede.

Istruzioni d’uso:

Proteggere la lesione aperta sul piede con una fasciatura o similari. Non indossare l’ortesi sulla pelle nuda, ma sempre insieme a una calza o un calzetto.

La stecca per nervo peroniero BORT a suola lunga può essere utilizzata solo insieme a una scarpa. Posizionare l’ortesi nella scarpa e indossarla insieme all’ortesi sul piede interessato. Assicurarsi che non vi siano punti di pressione. Chiudere quindi la chiusura sulla gamba. Dopo la rimozione dell’ortesi, controllare che piede e polpaccio non presentino arrossamenti cutanei e punti di pressione.

Indicazioni:

Paralisi del nervo peroneale.

Controindicazioni:

Vaste lesioni cutanee, neuropatia periferica (ad es. diabete mellito), ipersensibilità ad uno dei materiali impiegati.

Composizione dei materiali:

Materiale plastico: 100% Polipropilene
Chiusura a Velcro uncino / asola: 100% Poliammide
Imbottitura per polpaccio: 50% Poliammide, 50% schiuma di PU

Avvertenza importante:

Non è consentito il riutilizzo del prodotto – il presente mezzo ausiliario è destinato al trattamento di un solo paziente.
Evitare di compromettere la circolazione ematica. In caso di senso di parestesia, allentare la fascia e, se necessario, rimuoverla. Se i disturbi dovesse-
ro persistere, consultare un medico.
In caso di punti di pressione, escoriazioni cutanee o similari, far controllare immediatamente la stecca/fascia da un tecnico ortopedico o dal medico.

Größen / Sizes / Dimensions / Tamaños / Misure

	Schuhgröße / Shoe size / Pointure / Tamaño / Numero di scarpe
small	35 – 37
medium	38 – 40
large	41 – 43
x-large	44 – 46
rechts oder links angeben/demand for right or left hand/indiquer à gauche ou à droite/ indicar a la derecha o a la izquierda/Indicare destra o sinistra	

Pflegehinweis / Washing instruction / Instructions de lavage / Instrucciones para el cuidado / Manutenzione

	Kann mit mildem Feinwaschmittel und lauwarmen Wasser gesäubert werden.
	Can be cleaned with a mild detergent and lukewarm water.
	Peut être nettoyé à l’eau tiède avec de la lessive pour linge délicat.
	Se puede limpiar con detergente suave para ropa delicada y agua templada.
	Può essere lavata con sapone neutro e acqua tiepida.

Stand: November 2011

381-470630/D-1/1/11 wm



BORT GmbH | Postfach 1330 | D-71367 Weinstadt
Telefon (07151) 99200-0 | Telefax (07151) 99200-50
www.bort.com | medical@bort.com

orthopädie
chirurgie
sportmedizin
rehabilitation



Peronäus-Schiene langsohlig

Peroneal Splint long soled
Eclisse péronaeus semelle entière
Férula peronaeus suela larga
Stecca peroneale a suola lunga



Art.-No.
470 630

orthopädie
chirurgie
sportmedizin
rehabilitation

D

Die Behandlung mit einer Peronäus-Schiene dient zur Korrektur der Fußstellung bei einer Lähmung der Fußheber- und Peronäusmuskeln, die unbehandelt zu einer Spitzfußstellung führen kann.

Gebrauchsanleitung:

Schützen Sie offene Verletzung am Fuß durch einen Verband oder ähnliches. Tragen Sie die Orthese nicht auf nackter Haut, sondern immer in Verbindung mit einem Strumpf oder einer Socke. Die BORT Peronäus-Schiene langsohlig kann nur in Verbindung mit einem Schuh getragen werden. Positionieren Sie die Orthese im Schuh und ziehen Sie diesen gemeinsam mit der Orthese am betroffenen Fuß an. Achten Sie auf druckfreien Sitz. Schließen Sie nun den Verschluss am Unterschenkel. Nach Abnahme der Orthese kontrollieren Sie Fuß und Wade auf Hautrötungen und Druckstellen.

Indikationen: Peronäuslähmung.

Kontraindikationen:

Großflächige Verletzungen der Haut, kontrakter Spitzfuß, periphere Neuropathie (z. B. Diabetes mellitus), Überempfindlichkeit gegen eines der verwendeten Materialien.

Materialzusammensetzung:

Kunststoff: 100% Polypropylen
Flausch/Klettverschluss: 100% Polyamid
Wadenpolster: 50% Polyamid, 50% PU-Schaum

Wichtiger Hinweis:

Kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Patienten bestimmt.
Wurde das Tragen bei Nacht angeordnet, Beeinträchtigungen des Blutkreislaufs vermeiden. Bei Taubheitsgefühl Hilfsmittel lockern und ggf. abnehmen. Bei anhaltenden Beschwerden den Arzt aufsuchen.
Beim Auftreten von Druckstellen, Hautabschürfungen oder ähnlichem den Sitz der Schiene unverzüglich von Ihrem Orthopädietechniker oder Arzt überprüfen lassen.

GB

The treatment with Peroneal Splint serves to correct the leg positioning in case of the foot lifting and peroneal muscle paralysis, which untreated could result in pes equinus.

Instruction to use:

Protect open injuries on the foot with a dressing or similar. Do not wear the brace on the bare skin but always together with a stocking or sock. The BORT long soled Peroneal Splint can only be worn together with a shoe. Position the brace in the shoe and put the shoe together with the brace on the affected foot. Ensure a pressure-free fit. Now close the fastener on the lower leg. After removing the splint, check the foot and calf for skin reddening and pressure points.

Indications:

Peroneal paralysis.

Contraindications:

Large-area skin injuries, peripheral neuropathy (e.g. diabetes mellitus), over-sensitivity against one of the materials used.

Composition:

Plastic: 100% Polypropylene
Knit loop/Velcro closure: 100% Polyamide
Calf pad: 50% Polyamide, 50% PU-foam

Important Instructions:

No reutilisation – this medical device is meant for the care of one patient only.
Wear brace only when under strain, not during rest or sleep. Avoid hindering blood circulation. In case of numbness loosen brace and remove it if necessary. If complaints continue, please contact the doctor.
If pressure points, abrasions or similar occur, have your orthopaedic technician or doctor check the fit of the splint immediately.

F

Le traitement avec une éclisse péronaeus sert à corriger la position du pied lors d’une paralysie des muscles péronaeus qui font lever le pied. Sans traitement, cela peut aboutir à un pied équin.

Mode d’emploi:

Protégez les blessures ouvertes du pied, par ex. avec un pansement. Ne portez pas l’orthèse sur la peau nue, mais toujours avec un bas ou une chaussette. L’orthèse releveuse de pied à semelle entière BORT ne peut être portée qu’avec une chaussure. Positionnez l’orthèse dans la chaussure et enfilez celle-ci en même temps que l’orthèse sur le pied concerné. Prenez garde à ce que l’orthèse ne crée aucun point de pression. Fermez alors l’orthèse au niveau de la jambe. Au retrait de l’orthèse, vérifiez l’absence de rougeurs cutanées ou de points de pression sur le pied et le mollet.

Indicaciones:

Paralysie péronaeus.

Contre-indications:

Plaies de grande surface de la peau, neuropathie périphérique (ex.: diabetes mellitus), hypersensibilité à une des substances utilisées.

Composition des matières:

Plastique: 100% Polypropylène
Lacet/fermeture Velcro: 100% Polyamide
Capitonnage mollet: 50% Polyamide, 50% mousse PU

Note importante:

Pas de réutilisation – ce produit est destiné à l’usage d’un seul patient.
Évitez de gêner la circulation du sang. En cas de sensation d’engourdissement, relâchez les fermetures et enlevez l’éclisse, si nécessaire. Si les troubles persistent, consultez votre médecin.
En cas d’apparition de points de pression, d’éraflures ou autres problèmes, faites immédiatement contrôler la position des éclisses/du bandage par votre orthopédiste ou votre médecin.

E

El tratamiento con una férula peronaeus sirve para corregir la posición del pie en caso de una parálisis de los músculos peronaeus que levantan el pie. Sin tratamiento, puede llevar a un pie equino.

Modo de empleo:

Proteja la herida abierta del pie con un vendaje o similares. No coloque la ortesis directamente sobre la piel. Utilice siempre una media o un calcetín. La férula peronea BORT con suela larga sólo se puede utilizar con zapato. Coloque la ortesis en el zapato e introduzca después en él el pie afectado. Asegúrese de que el zapato se ajusta sin presión. Cierre ahora la ortesis en la pantorrilla. Cuando retire la ortesis compruebe si hay irritaciones o puntos de presión en el pie o en la pantorrilla.

Indicaciones:

Parálisis peronaeus.

Contraindicaciones:

Lesiones cutáneas extensas, neuropatía periférica (vg. Diabetes mellitus), hipersensibilidad a alguno de los materiales empleados.

Composición:

Plástico: 100% Polypropileno
Cierre de terciopelo y ganchos: 100% Poliamida
Acolchado de la pantorrilla: 50% Poliamida, 50% espuma PU

Nota importante:

Este producto no debe reutilizarse – es solamente destinado para un paciente. Evitar la reducción de la circulación sanguínea. En caso de sensación de entumecimiento abrir los cierres y retirarlos, si fuera necesario. En caso de trastornos continuos consulte al médico.
El ajuste de la férula/venda deberá ser inmediatamente revisado por el técnico ortopédico o por el médico si aparecen puntos de presión, excoriaciones o lesiones similares.